

Empfehlung für schwangere und stillende Frauen

Booster-Impfung mit mRNA-Impfstoffen gegen das SARS-CoV-2-Virus

Eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG) gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin e.V. (DGPGM), der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin e.V. (DGPM) sowie der Nationalen Stillkommission (NSK)

unterstützt durch den *Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF)*

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat sich am 18.11.2021 für eine Booster-Impfung von Schwangeren gegen COVID-19 ab dem 2. Trimenon mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty® ausgesprochen¹. Die Deutsche Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin e.V. (DGPGM) begrüßt gemeinsam mit den anderen Deutschen Fachgesellschaften für Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit diese Empfehlung ausdrücklich und hatten bereits Mitte November analog zur Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG) erklärt, dass auch Schwangere und stillende Frauen von einer Auffrischimpfung profitieren². Mit Verweis auf den ausführlichen Bericht zur Nutzen-Risiko-Bewertung einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff in der Schwangerschaft und Stillzeit im Epidemiologischen Bulletin Nr. 38 vom 23.09.2021³ schließen sich die aufgeführten Fachgesellschaften dem Wortlaut der OEGGG an.

Die Empfehlung zur Boosterung ist durch die derzeit rapide steigenden Infektionszahlen sowie den nachweislich nach sechs Monaten sinkenden Antikörperspiegel in der allgemeinen Population mit parallel steigenden Impfdurchbruchsinfektionen begründet⁴. In den Ausführungen der STIKO wird ab sechs Monaten nach der 2. Impfung die Verabreichung einer 3. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Insbesondere Personen mit höherem Erkrankungsrisiko sind angesprochen. Für die spezifische Booster-Impfung in der Schwangerschaft stehen aufgrund der relativ kurzen Verfügbarkeit bzw. Anwendung einer 3. Verabreichung der Impfung noch keine abrufbaren Daten zur Verfügung. Die amerikanische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (ACOG) sowie die amerikanische Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) und das britische Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) empfehlen jedoch für alle schwangeren Frauen, inklusive MitarbeiterInnen im medizinischen Bereich, die Verabreichung einer 3. Dosis mittels dem mRNA-Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/ Pfizer ab sechs Monaten nach der ersten Impfserie mittels

Präsident

Priv.-Doz. Dr. D. Schlembach
Klinik für Geburtsmedizin
Vivantes Klinikum Neukölln
Rudower Str. 48
12351 Berlin
Tel.: 030/130148486

Vizepräsidentin

Priv.-Doz. Dr. C. Kähler
Praxis Dr. Christiane Kähler
Anger 81
99084 Erfurt
Tel.: 0361/64430540

Schriftführerin

Prof. Dr. T. Groten
Klinik für Geburtsmedizin
Universitätsklinikum Jena
Am Klinikum 1
07747 Jena
Tel.: 03641/9329207

Schatzmeister

Prof. Dr. S. Verlohren
Klinik für Geburtsmedizin
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Tel.: 030/450564445

Gründungspräsident

Prof. Dr. E. Saling †

Past-Präsidenten

Prof. Dr. M. Hansmann †
Prof. Dr. A. Feige
Prof. Dr. S. Schmidt
Prof. Dr. U. Gembruch
Prof. Dr. R. L. Schild, MA FRCOG
Prof. Dr. D. Grab

Vorstandsmitglieder

Prof. Dr. C. Enzensberger · Aachen
Prof. Dr. A. Geipel · Bonn
Dr. A. Heihoff-Klose · Leipzig
Prof. Dr. H. Helmer · Wien
Prof. Dr. K.O. Kagan · Tübingen
Prof. Dr. P. Klaritsch · Graz
Prof. Dr. M. Kühnert · Marburg
Prof. Dr. S. Kehl · Erlangen
Prof. Dr. W. Rath · Aachen
Prof. Dr. E. Schleußner · Jena
Dr. S. Seeger · Halle
Prof. Dr. H. Stepan · Leipzig
Prof. Dr. D. Surbek · Bern

diesem Impfstoff^{5,6,7}. Die 3. Impfung – die sogenannte Boosterung – kann laut dem amerikanischen Expertenkonsensus zu jeder Zeit in der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt verabreicht werden.

In Anbetracht des derzeitigen Infektionsgeschehens, dem größeren Risiko für einen schweren Verlauf in der Schwangerschaft sowie der Unbedenklichkeit der Impfung für das Ungeborene (basierend auf den derzeitig verfügbaren Daten für die ersten zwei Impfdosen), wird eine Booster-Impfung mit Comirnaty® in der Schwangerschaft empfohlen.

Bezüglich des optimalen Zeitpunkts der Verabreichung der 3. Impfung in der Schwangerschaft gibt es noch keine belastbaren Daten – somit ist dieser, je nach Intervall zur 2. Impfung bzw. ab dem 2. Trimenon (analog zu den ersten 2 Impfdosen), möglich.

Redaktionsgruppe:

DGPM

Prof. Dr. med. Ulrich Pecks (Kiel)*, Prof. Dr. med. Ekkehard Schleußner (Jena),
Dr. med. Janine Zöllkau (Jena)

DGGG

Prof. Dr. med. Anton Scharl (Amberg), Prof. Dr. med. Sven Kehl (Erlangen),
Dr. med. Carsten Hagenbeck (Düsseldorf)

DGPGM

PD Dr. med. Dietmar Schlembach (Berlin)

NSK

Prof. Dr. med. Michael Abou-Dakn (Berlin)

*Korrespondierender Autor: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel,
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Arnold-Heller-Straße 3, 24105 Kiel, Ulrich.Pecks@uksh.de

Literatur:

1. https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Schwangere_Stillende.html
2. <https://www.oeggg.at/leitlinien-stellungnahmen/covid-19-sars-cov-2/>
3. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/38_21.pdf
4. Nanduri, S et al. (2021). Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Nursing Home Residents Before and During Widespread Circulation of the SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant — National Healthcare Safety Network, March 1–August 1, 2021. MMWR 2021: 70.
5. SMFM - Provider Considerations for Engaging in COVID-19 Vaccine Counseling with Pregnant and Lactating Patients, einsehbar unter https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/media/3134/Provider_Considerations_for_Engaging_in_COVID_Vaccination_Considerations_10-1-21_%28final%29.pdf
6. ACOG - COVID-19 Vaccination Considerations for Obstetric–Gynecologic Care einsehbar unter <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care>
7. RCOG – COVID-19 vaccines, pregnancy and breastfeeding, einsehbar unter <https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/coronavirus-covid-19-pregnancy-and-womens-health/covid-19-vaccines-and-pregnancy/covid-19-vaccines-pregnancy-and-breastfeeding/>